


Mon pénis va éclater!

Le Viagra® ou Cialis®, la pelule miracle pour avoir une érection béton. La dysfonction érectile est un problème que les hommes de tout âge peuvent rencontrer à un moment ou un autre de leur vie. C'est dur sur l'orgueil, surtout quand t'es dans le feu de l'action, mais que le membre lui ne l'est pas. Stress, angoisse, de ne pas plaire, de ne pas faire la job, la conso, plein de facteurs peuvent en être la cause. La plupart du temps si tu as un problème réel, un docteur t'arrangerait ça assez bien en te donnant les doses que tu as de besoin.



Aujourd'hui même mon livreur de pot en vend, jamais sûr si c'est du vrai ou non, mais quand même! L'affaire, c'est que le Viagra® est un médicament qui agit directement sur des substances chimiques dans le corps, qui font se dilater les vaisseaux sanguins permettant au sang de se rendre plus facilement dans ton beau pénis. Ce qui le fait lever et vouloir s'enfourmer partout lors d'excitations sexuelles. Les Popper's et Rochefort provoquent le même effet que le Viagra®. (Voir texte sur les solvants page 5)

Je ne sais pas si tu te souviens de tes maths, mais quand on additionne un + avec un autre + ça = un gros -. Autrement dit, deux substances qui dilatent les vaisseaux sanguins qui s'additionnent deviennent dangereuses. Ça peut donc provoquer de l'hypotension. L'hypotension, c'est quand t'as pas assez de pression dans les tuyaux parce qu'ils sont trop dilatés pour que le sang se rend partout pour faire sa job.

Le Viagra® peut provoquer des érections durables, mais dangereuses. Après 4 heures si tu ne débantes pas ça devient dangereux. Tu dois aller à l'hôpital. Après 6 heures, on appelle ça une crise de priapisme. Pis ça, ça peut causer des lésions permanentes au pénis ou pire une impuissance éternelle.

CONTRE-INDICATIONS IMPORTANTES

Il est strictement déconseillé de prendre du Viagra® quand :

- On a des troubles au foie comme l'hépatite A, B ou C ou une cirrhose ;
- On suit un traitement antirétroviral (trithérapie contre le VIH) ;
- On prend n'importe quel antibiotique (ex. : pharyngite, amygdalite, etc.) ;
- On prend des médicaments contre les champignons de la peau ;
- Et si mélanger avec des dérivés de nitré (Popper's) cela peut causer de l'hypotension, pouvant être mortel!

Ce que je trouve inquiétant là dedans, c'est que certaines des ces grosses contre-indications s'adonnent à être aussi des habitudes bien ancrées dans les milieux des hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes. On le sait que ça fais partie du trip de cul avec le Viagra® : p'tite pause, puff de Popper's et on recommence! Mais faites gaffe les mecs!

Faut pas oublier que l'alcool aussi est contre-indiqué. En fait, elle risque de faire diminuer l'effet du médicament et c'est sûrement pas ça le but en le gobant!

N'oubliez pas la formule mathématique : Deux + égal un gros -
Bonne baise! ■



Kaven,
Infoman à Montréal