



poursuite au criminel en contactant le service de police (même si on ne les aime pas toujours!). S'il s'agit d'un agent de la STM, appelle au service à la clientèle de la STM. C'est sûr que ces démarches peuvent prendre du temps, mais bon, si personne ne dénonce les abus, jamais ils ne cesseront.

**Enfin, le meilleur conseil que je peux te donner c'est : essaye donc de les éviter! ■**

POUR EN SAVOIR PLUS, ALLER VOIR LE SITE DU BUREAU DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE : [HTTP://WWW.BUREAUSECURETIVEE.QC.CA](http://www.bureausecuriteprivée.qc.ca)

\*SOCIÉTÉ DES TRANSPORTS DE LA VILLE DE MONTRÉAL

**Sources :**

- Guide de survie face aux agent(e)s de sécurité privé(e)s, par Sophie Sénécal pour l'Association pour la Liberté d'Expression (2013).

**Mumu**  
Infomane à Montréal

ILLUSTRATIONS © **Mumu**



## La lymphogranulomatose vénérienne (LGV)

**Bon, encore une autre Infection Transmissible Sexuellement (ITS)... Comme si on avait besoin de ça... Faut que ça cesse!**

Non, sérieux... Depuis le début de l'année, il y a eu 18 cas déclarés de LGV à Montréal, ce qui est 2 fois plus que la moyenne annuelle des 3 dernières années. Dans tous les cas, ce sont des hommes qui ont des relations sexuelles avec d'autres hommes qui sont touchés, et un grand nombre d'entre eux sont séropositifs.

### **Kossé ça la LGV?**

C'est une ITS causée par une bactérie de la famille de la Chlamydia

### **On pogne ça comment au juste?**

Comme toutes les ITS, en ayant une relation sexuelle non protégée (non, mais tsé...!) Plus précisément, tu risques de l'attraper si tu entres en contact avec une muqueuse infectée, que tu vois ou non des lésions, lors de relations vaginales, anales ou orales. Les doigts, les dildos, les gants et les condoms ayant été en contact avec des écoulements ou des sécrétions infectées avec la LGV peuvent transmettre la bactérie.

### **Kossé ça fait ?**

Il y a trois stades à l'infection



### **STADE 2 (LGV SECONDAIRE) :**

2 à 6 semaines après avoir été infecté

- Tu pourrais avoir une infection des ganglions
- Tu pourrais avoir des abcès et des écoulements de pus.

### **STADE 3 (LGV TERTIAIRE) :**

Si tu ne te fais pas traiter, tu pourrais avoir des complications graves telles que :

- Avoir de grosses inflammations au rectum, même qu'il pourrait se perforer! Ouch....
- Tes organes génitaux pourraient gonfler (ça ne semble pas grave) et devenir difforme (ok, laisse faire d'abord)

Pour te faire traiter, consulte un professionnel de la santé. Jusqu'au stade 2, tu n'auras qu'à prendre des antibiotiques pendant 3 semaines (et c'est gratuit quand tu as la carte d'assurance maladie!). Si tu attends trop, tu pourrais avoir besoin d'une intervention chirurgicale, faque niaise pas avec la puck!!! Pis oublie pas d'avertir tes partenaires!!!

### **Kessé que je fais pour éviter que ça arrive?**

Met des condoms, utilise des digues dentaires, mets des gants pour le *fist fucking*, protège tes dildos, pis si t'es dans un trip à plusieurs, change de gants ou de condoms à chaque fois que tu changes de trou!!! ■

### **STADE 1 (LGV PRIMAIRE) :**

3 à 30 jours après avoir été infecté

- Tu peux avoir une petite lésion à l'endroit où la bactérie est entrée. Ça peut être sur la bouche, dans la gorge, sur le pénis, le vagin, la vulve, le col utérin et le rectum.
- Tu peux avoir ces lésions sans même t'en rendre compte et elles peuvent disparaître, mais tu as quand même la LGV. Ça prend ABSOLUMENT un traitement pour en guérir
- Si tu as la LGV dans l'urètre, ça va chauffer quand tu pisses.

**Alexandra**  
COORDONNATRICE DE L'INJECTEUR

ILLUSTRATIONS © **Mélissa Blais-Lusignan**

**Sources :**

- Direction de santé publique de Montréal  
- Rézo